Vaccination selon le terrain vacciner les personnes vulnérables

DUACAI 18/03/2022

N Viget

Dr Ajana

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2021

Juillet 2021

Calendrier complémentaire des recommandations vaccinales 2021 COVID-19

22 Décembre 2021

Composition d'un vaccin

Principe actif : agent immunogène

Conservateurs

Adjuvants :

- Alumine : seuil toxicologique 1mg/Kg/j&
0,80 mg / dose de vaccin
- Autres : Squalène, 804, MF59 ___

Diluant

Tolérance

Allergie

Pharmacovigilance la plus activée de tous les produits de santé

Type	Vaccin	Caractéristiques
Vac. Inactivé, tué (VT)	Grippe, Polio	Germe entier tué par agents chimiques ou chaleur Stable, bien toléré, adjuvants . Rappels pour une bonne protection
Vac. Vivant atténué (VA)	ROR, varicelle, zona VA grippe nasal, polio oral, fièvre jaune	Germe entier atténué. Très immunogène = réponse cel.et humorale Protection à long terme avec 1 à 2 doses
Sous unité Polysaccharide Protéique conjuguée.....	PPSV23 VH B, HPV, Zona SU Hib, PCV13, MCV4	Composants les plus immunogènes stable et bien tolérés Onéreux pour certains plus immunogènes si conjugués
Toxine	Tétanos - diphtérie	Inactivée, stables, bien tolérés, nécessité de rappels

Personnes vulnérables : Agés fragiles avec co- morbidités

Agés extrêmes de la vie

- < 1 an = immuno-immaturité

Senior= immuno-sénescence

maladies chroniques

Réceptivité aux infections et réponse vaccinale plus faible

Facteurs de risque infectieux

Terrain

- Age
- Co-pathologies cardiorespiratoires, diabète
- Maladies inflammatoires chroniques, auto-immunes
- ID: Cancer organe solide, hémopathie, VIH ...

Traitement IS

- Corticothérapie, radiothérapie, chimiothérapie, biothérapie

Jackson . *Clin Infect Dis*. 2008; 4347 (10): 1328-1338

Torres A, et al. *Thorax* 2015;70:984-989.

High KP . *Clinical Infectious Diseases*. 2005; 40:114-22.

Htwe TH, Mushtaq A, Robinson SB.. *Infect Dis Clin N Am*. 2007;27: 711-

Incidence élevée des maladies infectieuses sévères chez l'ID

Jackson & al Pneumococcal Vaccination of Elderly Adults: New Paradigms for Protection. Clin Infect Dis. 2008; 43:47 (10): 1328-1338

Yin Z et al. AIDS. 2012;26(I):87-94.

Figure 4. Forest plot of network meta-analysis: serious infections

Singh JA& al al Cochrane Review 2011

Vacciner les seniors et les fragiles précocement

La prévention primaire la plus coût-efficace

Age : immuno - sénescence

- Baisse de la réponse à tout vaccin
- Baisse de la résistance à toute infection

Co - pathologies possibles :

- Diminution de la réponse vaccinale
- Susceptibilité aux infections invasives graves

**Vacciner au fil de la vie
de la naissance à
l'institutionnalisation**

Vacciner à un jeune âge

Anticiper la protection vaccinale avant toute pathologie ou traitement fragilisant

Application du calendrier vaccinal:

- 1- Mise à jour des vaccins selon calendrier
 - DTPca -, haemophilus - hépatite B , ROR, méningites
- 2-Vaccinations selon le terrain :
 - Pneumocoque, grippe, Zona,....
- 3 - Statut des maladies à prévention vaccinale :
 - Sérologie varicelle , VHBsi besoin vacciner ou de protéger autrement

Tableau des vaccinations chez les enfants et les adolescents – 2021

Pour toute personne ayant déjà reçu un ou des vaccins avant la mise en place du calendrier vaccinal en 2013, se référer aux chapitres correspondants et/ou tableaux 4.8

Maladies contre :	Naissance	2 mois	4 mois	5 mois	11 mois	12 mois	16–18 mois	6 ans	11–13 ans	15 ans	16 ans
Diphtérie (D), Tétanos (T), Coqueluche acellulaire (C), Poliomyéélite (P)		DTCaP	DTCaP		DTCaP			DTCaP			
Haemophilus influenzae		Hib	Hib		Hib						
Hépatite B (Hep B)		Hep B	Hep B		Hep B						
Coqueluche (PnC) ¹		PnC	PnC		PnC						
Coqueluche C conjugué MnC				MnC		MnC					
Poliole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)						ROR 1	ROR 2				
Diphtérie (d), Tétanos (T), Coqueluche acellulaire (C), Poliomyéélite (P) ²									dTcaP		
Herpès virus humains chez jeunes filles									2 doses (0,6 mois) : vaccin nonavalent* (11/14 ans)		
Hépatite B						3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou, de 11 à 15 ans révolus, 2 doses selon le schéma 0, 6 mois ³					
Coqueluche C conjugué						1 dose jusqu'à 24 ans ⁴					
Herpès virus humains chez jeunes filles et les garçons										3 doses selon le schéma 0, 2, 6 mois ou, de 11 à 15 ans révolus, 2 doses selon le schéma 0, 6 mois ³	
Poliole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)								2 doses à au moins 1 mois d'intervalle si pas de dose précédente ; 1 dose si une seule dose vaccinale antérieure			

Les vaccins indiqués sur fond bleu sont obligatoires pour les enfants à partir du 1^{er} janvier 2018. Encadrés verts : co-administration possible.

Si un retard est intervenu dans la réalisation du calendrier de vaccinations indiqué, il n'est pas nécessaire de recommencer tout le programme vaccinal ce qui imposerait des injections multiples.

2.19.3 Vaccination des nourrissons nés prématurés

Est considérée comme prématurée, toute naissance qui survient avant 37 semaines d'aménorrhée, soit avant le 8^{ème} mois de grossesse. Le prématuré est exposé à un risque infectieux accru en termes d'incidence et de gravité, en particulier pour la coqueluche.

La vaccination de routine doit débuter à 2 mois d'âge chronologique, quel que soit le degré initial de prématurité.

Schéma de vaccination du prématuré (hors nouveau-nés de mère Ag HBs +)

2 Mois	3 Mois	4 Mois	5 Mois	11 Mois	12 Mois	18 Mois
DTCPHibHepB* VPC13**	VPC13**	DTCPHibHepB VPC13**	Men C***	DTCPHibHepB VPC13**	Men C ROR Dose1	ROR Dose 2

* Vaccination avec le vaccin hexavalent à effectuer en milieu hospitalier en cas de facteurs de risque (prématuré de moins de 33 semaines et/ ou poids de naissance de moins de 1500 g, oxygénothérapie ou bronchodysplasie en période néonatale)

** Vaccin conjugué 13-valent contre le pneumocoque

*** Vaccin contre le méningocoque C

N.né de maman HBs +

- 1^{ère} dose vaccin hépatite B + Ig Spécifiques
- 2^{ème} dose vaccin hépatite B à un mois
- 3^{ème} dose entre 6 et 12 mois

	Vaccins contre :	18-24 ans	25 ans	35 ans	45 ans	65 ans	> 65 ans	
Recommandations générales	Diphtérie (d), Tétanos (T), Poliomyélite (P)		Rappel dTcaP ¹ ou dTP si dernier rappel de dTcaP < 5 ans		Rappel	Rappel	Rappel à 75, 85 ans...	
	Coqueluche acellulaire (ca)							
	Grippe					1 dose annuelle		
	Zona					Entre 65 à 74 ans : une dose ²		
Rattrapage	Coqueluche acellulaire (ca)		1 dose dTcaP chez l'adulte jusqu'à 39 ans révolus, n'ayant pas reçu de rappel à 25 ans					
	Méningocoque C (vaccin conjugué)	1 dose ³						
	Papillomavirus humains (HPV) chez les jeunes femmes et les jeunes hommes	3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou 0, 2, 6 mois (jeunes jusqu'à l'âge de 19 ans révolus)						
	Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)	Atteindre 2 doses au total chez les personnes nées depuis 1980						
	Rubéole	1 dose de ROR chez les femmes non vaccinées en âge de procréer						
Populations particulières et à risque	Coqueluche acellulaire (ca)	Cocooning ⁴ : personnes non vaccinées depuis l'enfance ou pour les adolescents ou adultes de moins de 25 ans dont la dernière injection remonte à plus de 5 ans : 1 dose de dTcaP ¹ . Pour les personnes antérieurement vaccinées à l'âge adulte et à nouveau en situation de cocooning, revaccination si la dernière dose de vaccin coquelucheux date de plus de 10 ans (délai minimal d'un mois entre 1 dose de dTP et 1 dose de dTcaP) ⁵						
	Grippe	1 dose annuelle si risque particulier ⁶						
	Hépatite A	2 doses selon le schéma : 0, 6 mois si exposition à un risque particulier ⁷						
	Hépatite B	3 doses selon le schéma : 0, 1, 6 mois si exposition à un risque particulier ⁸ . Pour certains cas particuliers, cf. <i>infra</i> ⁹						
	Méningocoque ACYW (conjugué)	1 dose au contact d'un cas ¹⁰ 2 doses à un mois d'intervalle chez les personnes ayant un déficit en complément ou en properdine, recevant un traitement anti-C5 ou aspléniques et chez les personnes ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques						
	Méningocoque B	2 doses à un mois d'intervalle chez les personnes ayant un déficit en complément ou en properdine, recevant un traitement anti-C5 ou aspléniques et chez les personnes ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques						
	Pneumocoque	Pour les adultes à risque élevé d'infection invasive à pneumocoque ¹¹ , voir les différents schémas vaccinaux et tableau (paragraphe 2.11)						
	Varicelle	2 doses ¹² si risque particulier						
	Fièvre jaune	1 dose pour les résidents du département de la Guyane ou les personnes issues de la métropole qui y séjournent ou souhaitent s'y rendre sauf cas particuliers cf. chap 2.4 ¹³						
	Papillomavirus humains (HPV)	Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu'à 26 ans						

Vacciner la femme enceinte

*Le Centre de Référence sur
les Agents Tératogènes*

www.lecrat.org

Tout vaccin efficace et jugé nécessaire à la protection maternelle est possible en cours de grossesse

Anticiper la protection de la femme en âge de procréer (avant la grossesse)

Mise à jour des vaccins

- dTPca , ROR (sous contraception)

Statut de la varicelle :

- Sérologie si besoin
- Vaccin sous contraception : 2 doses

Vacciner la femme enceinte ...

Ne pas manquer les occasions de le faire

- 1- la protéger contre les infections :
 - plus graves et mortelles pendant la grossesse
 - 2 - Prévenir la transmission verticale
 - 3 - Protéger le bébé
 - Anticorps transmis protecteurs jusque 3 à 6 mois
-
- Données rassurantes vaccins et grossesse !!

Vacciner la femme enceinte = une prévention pour deux

Alzamora L al. Am J Perinatol. 2020 Jun; 37(8): 861-865

Wintehead & al. Am J Perinatal. 2020 Jun; 37(8): 861-865

Krubiner & al. Vaccine. 2021 Jan 3; 39(1): 85-120

y Laris-Gonzalez& al. Vaccines (Basel.) 2020 Mar; 8(1): 124

TABLEAU DES VACCINATIONS AUTOUR DE LA GROSSESSE

Avant la grossesse	Pendant la grossesse	En post-partum
<ul style="list-style-type: none">■ Coqueluche (dTPca)■ Rougeole-oreillons-rubéole (ROR)*■ Varicelle*■ Vaccinations recommandées dans des situations particulières : pneumocoque, hépatite B, fièvre jaune...■ Infections invasives à méningocoque C jusqu'à 24 ans	<ul style="list-style-type: none">■ Grippe■ Vaccinations en fonction du bénéfice/risque en cas d'exposition particulière, les voyages notamment : dTP, hépatites A et B, fièvre jaune**, méningocoque (vaccin tétravalent)■ COVID-19	<ul style="list-style-type: none">■ Coqueluche (dTPca)■ Rougeole-oreillons-rubéole (ROR)*■ Varicelle*■ Vaccinations recommandées dans des situations particulières : pneumocoque, hépatite B, fièvre jaune**■ Infections invasives à méningocoque C jusqu'à 24 ans

* en l'absence d'immunité.

** pendant la grossesse et en post-partum : en fonction de l'analyse bénéfice/risque. L'allaitement doit être suspendu pendant deux semaines après une vaccination contre la fièvre jaune.

Vaccination grippe et grossesse

Réponse immunitaire :

- comparable à celle de la femme non enceinte

Efficacité :

- baisse de 36% (5C95% 4-5J) des épisodes respiratoires fébriles : Etude Vac grippe & Vac pneumo (340 femmes vaccinées au 3^{ème} trimestre)

Protection des nouveaux nés de mères vaccinées

Vacciner la femme enceinte contre la grippe (depuis le H1N1) et quelque soit le terme ...

Englund JA, & al. Vaccine 2003; 21: 3460-64).

Zaman K, & al. N Engl J Med. 2008; 359:1555-64)

Zaman K, & al. N Engl J Med. 2008; 359:1555-64).

Vaccination covid et grossesse

- *Grossesse FDR de COVID sévère
- *Données nombreuses et rassurantes sur les vaccins ARNm
- *Passage des AC transplacentaires: concentration chez le Nné corrélées à celles de la mère

Par rapport à une femme enceinte non infectée, **il existe un risque multiplié par 18 d'admission en soins intensifs, par 2,8 de perte foetale, par 5 d'admission du nouveau-né en soins intensifs, lorsque la mère est infectée.**

Protection 6 premiers mois de vie₄: 60% de réduction de risque d'hospitalisation de l'enfant quand la mère est vaccinée, alors que 88% des nouveau-nés hospitalisés en réanimation sont nés de mère non vaccinée (CDC, fev 2022)

La vaccination est recommandée chez les femmes enceintes dès le premier trimestre de grossesse.

Il est recommandé d'utiliser les **vaccins à ARNm** pour la vaccination des femmes enceintes.

Le CRAT précise qu'il n'y a aucun délai à respecter entre une vaccination contre la Covid-19 par vaccin à ARNm ou à vecteur viral et le début d'une grossesse.

*Goldshtein , JAMA 2021
Chavan J Obstet Gynecol 2021
Luxi Drug safety 2021*

Vacciner le patient allergique

La seule contre-indication=l'anaphylaxie = CI du vaccin contenant l'allergène

=> avis allergologique

Sinon chez le patient allergique

- vacciner en dehors d'une poussée et surveiller en post vaccinal
- Verifier que le vaccin ne contient pas de composants auxquels le patient est allergique (ex ATB neomycine)
- Prescrire un antihistaminique du jour de la vaccination jusque 2 jours après

Tableau des constituants des vaccins pouvant être responsables d'allergies.

Vaccins	Protéines d'œuf	Gélatine	Aminosides (traces)
Amaril <i>(fièvre jaune)</i>	Oui	-	-
Grippe	Oui	-	Néomycine ou Gentamicine
Polio inactivé injectable	-	-	Streptomycine, Néomycine
Rage	-	-	Néomycine
Rougeole-oreillons-rubéole	-	Oui*	Néomycine
Varicelle	-	Oui**	Néomycine
Zona	-	Oui	Néomycine
Encéphalite à tiques	Oui	-	Néomycine, Gentamicine

*Uniquement pour M-M-RVAXPRO®; ** vaccin Varivax®.

PEG, macrogol, polysorbate, trometamol et vaccins covid

Place du bilan allergologique

Le bilan allergologique permet d'**identifier les patients présentant un risque réel de développer une réaction anaphylactique** en cas de nouvelle exposition. La revaccination dépendra alors de ce bilan allergologique. Cependant, différents cas de figure sont à distinguer :

- **Si la réaction est uniquement locale, aucun bilan allergologique n'est nécessaire.** Il ne s'agit pas d'une réaction IgE médiée associée à un risque plus élevé de réaction anaphylactique lors d'une prochaine vaccination.
- **Si la réaction n'est pas immédiate, l'évaluation clinique suffit** et une investigation allergologique est inutile. Ce type de réaction n'est pas dangereux. Le risque d'hypersensibilité immédiate suite à la revaccination est faible. Par exemple, une réaction urticarienne bénigne post-vaccinale ne contre-indique donc pas une nouvelle vaccination. Pour assurer le confort du patient, celle-ci peut se faire sous couverture antihistaminique orale pendant 48 heures.
- **Si l'anamnèse suggère une réaction immédiate de type anaphylactique, un bilan allergologique est impératif.** Les réactions anaphylactiques imposent un bilan allergologique comportant des tests cutanés à lecture immédiate et des RAST (radio allergo sorbent test) aux divers antigènes vaccinaux, même si la valeur diagnostique et prédictive de ces tests est controversée.

mieux vacciner le senior!

A quel âge est - on senior?

50 ans, 60 ans, 65ans

Gravité du Covid19 et âge > 50 ans

L'immunosenescence

IS

Fig. 1 Immunological changes associated with aging and adaptive immunosenescence. Specific changes in the T and B cell compartments are known to occur with aging and the onset of immunosenescence. Naïve lymphocyte production, lymphocyte repertoire diversity, and the proliferative and functional capacity of effector lymphocytes all decline with age; similarly, increases in differentiated memory cell populations, lymph node fibrosis, and altered cytokine production all occur. These phenomena have been collectively associated with diminished vaccine responses and an increased susceptibility to viral infectious diseases in older adults. The mechanisms by which immunosenescence operates are not fully understood, and systems biology approaches are currently focused on elucidating these mechanisms in order to inform the rational design of vaccines for older adults

Immuno-senescence et conséquences

L'immunité innée :

- Baisse de la présentation de l'Ag
- Baisse de phagocytose, de régulation du CMH de classe 2 et de l'expression des TLR et pro-inflammation exacerbée

L'immunité acquise :

- Baisse de la réponse Humorale et Cellulaire plus marquée pour les néo -Ag
- Involution thymique LcT naïfs et Lct B moins efficaces ..

Figure 2. Ag-related change affect both innate and adaptive immunity. A multitude of changes in the immune system occur with aging and lead to greater susceptibility to infection and lesser response to vaccine. Aging-related changes are evident in both the innate (consisting mainly of macrophages, DCs and NK cells) and adaptive (represented by T and B cells) branches of the immune system. KIR: Killer Inhibitory receptor; mDC: Myeloid dendritic cell; NK: Natural killer; pDC: Plasmacytoid dendritic cell; ICR: T-cell receptor

Pneumococcal vaccine effectiveness against invasive pneumococcal disease by age of recipient and time since vaccination. The point estimate of vaccine effectiveness and 95% CI are indicated for each age group, 3 data points represent the vaccine effect <3 years, 3–5 years, and >5 years since vaccination, fr Data adapted from Shapiro et al. [5].

Expert Review of Vaccines 2011, Vol. 10, No. 11, Pages 1529-1537

Dugan & al Cellular Immunology 348 (2020) 103998

Jackson & al. Pneumococcal Vaccination of Elderly Adults: New Paradigms for Protection. Clin Infect Dis. 2008; 4347 (10): 1328-1338

4.5.3. Tableaux des vaccinations recommandées pour les personnes âgées de 65 ans et plus Hors Covid-19

4.5.3.a Population générale

Personnes âgées de 65 ans et plus	Vaccination	Schéma vaccinal
	Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite (dTP)	Une dose de rappel à 65, 75, 85 ans, etc.
	Grippe	Une dose annuelle
	Zona	Une dose unique La vaccination est recommandée chez les adultes âgés de 65 à 74 ans révolus Ce vaccin vivant atténué est contre-indiqué chez les personnes immunodéprimées

4.5.3.b Personnes âgées de 65 ans et plus présentant un risque particulier ou étant dans une situation à risque particulier

Vaccination	Schéma vaccinal
Pneumocoque	<p>Pour les personnes à risque élevé d'infection à pneumocoque¹</p> <ul style="list-style-type: none">• Non vaccinées antérieurement : VPC13* puis VPP23** (S8)• Vaccinées depuis plus de 1 ans avec le VPP23 : VPC13 puis VPP23 (délai 5 ans entre les 2 VPP23)• Déjà vaccinées par la séquence VPC13 - VPP23 : une nouvelle injection du VPP23 avec délai de 5 ans par rapport à la précédente injection de ce même vaccin
Coqueluche acellulaire (ca)	<p>Pour les personnes antérieurement vaccinées à l'âge adulte et à nouveau en situation de cocooning² :</p> <p>Une dose de dTcaPolio³</p> <p>Revaccination si la dernière dose de vaccin coquelucheux date de plus de 10 ans (délai minimal de 1 mois entre 1 dose de dTpolio et 1 dose de dTcaPolio).</p>
Hépatite A	<p>Pour les personnes exposées à un risque particulier⁴ : 2 doses selon le schéma 0,6 mois.</p> <p>Si la personne est née avant 1945, une sérologie préalable est fortement recommandée à la recherche d'anticorps témoins d'une immunité ancienne.</p>

Comment augmenter le pouvoir protecteur d'un vaccin

Concentration augmentée

- High dose vaccine 60 pg
- Adjuvants :
 - MF59 et AS03...
 - Protéine recombinante
 - Spike / SARS CoV2
- Vaccin intradermique ou transdermique
 - Intanza* 15 pg 0,1 ml à partir de 60 ans

Dugan & al Cellular Immunology 348 (2020) 103998

FluZone High-Dose
INFLUENZAVIRUS VACCINE

- + dosé: 60 mG HA
- Coût - efficace
- Voire cost -saving '
 - Réponse Ac
 - Prévention de la grippe
 - Baisse de l'hospitalisation

Figure 1. Immunogenicity of IIV3-HD and IIV3-SD in older adults: results from the phase IIIb/JV

Robertson & al. Expert Review of Vaccines . 2016 ; 15(12) : 1495-1505

Efluelda®		
Ages	Dose (ml)	Nombre de doses
65 ans et plus	0,7	1

Vaccinations et institutionnalisation

Une prévention primaire coût-efficace
pour tout le monde

Le patient en EHPAD

Environnement ouvert vers la communauté

Risque de bouffées épidémiques :

- Grippe, coqueluche, Covid 19
- Sources : visiteurs et personnel soignant
- Gravité des infections : morbi-mortalité

Protéger le patient en EHPAD

Responsabilité et devoir médical:

Vacciner précocement :

- Le résident dès son admission + vaccin grippe annuellement
- Soignant dès son embauche : med du travail
- L'entourage - visiteur !!

Vacciner en institution fait baisser la mortalité

Covid-19 : couverture vaccinale et mortalité en Ehpad

Données SI-Vac - Santé publique France - Ministère de la Santé / @nicolasberrod

◆ Au moins une dose ◆ Deux doses - Décès de résidents en Ehpad

Soignants-Soignés

Un risque infectieux à double sens

■ Maladies et prévention

- Sang : VIH, VHB, VHC
- Air : rhume, grippe , coqueluche, Covid 19
- Contact : Gastroentérites, Covid 19

Mesures universelles : matériel a usage unique et
Isolement air et contact

VACCINATIONS : grippe , pneumocoque , Zona , Covid19

BEH thématique mai 2009 N ° 18-19

Gaillat et al Journal of Hospital Infection (2008) 70, 272e277

Lemaître M et al J Am Geriatr Soc 2009; 57: 1580-6

Santé.gouv

Exposition des soignants aux maladies

Respiratoire	Orale	Inoculation
Coqueluche	Polio	Hépatite B
Diphtérie	Hépatite A	Hépatite C
Grippe	Hépatite E *	VIH
Méningite	Typhoïde	
Rougeole		
Tuberculose		
Varicelle		
Covid 19		

Prévention vaccinale efficace

pour la plupart

4.5.3.c Tableau des vaccinations recommandées chez les professionnels de santé et les professionnels des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées Hors Covid-19

Catégorie de professionnel	dTpolio	Coqueluche	Grippe saisonnière	Hépatite B	ROR	Varicelle
Professionnels des établissements ou organismes de prévention et /ou de soins	Obl	Rec	Rec	Obl si exposés	Rec Y compris si nés avant 1980 sans ATCD	Rec sans ATCD ou séronégatifs
Professionnels libéraux n'exerçant pas en établissements ou organismes de prévention et /ou de soins	-	Rec	Rec	Rec	Rec Y compris si nés avant 1980 sans ATCD	Rec sans ATCD ou séronégatifs
Personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées	Obl	Rec	Rec	Obl si exposés	-	-
Personnels des services sanitaires de maintien à domicile pour personnes âgées	Obl	-	Rec	Obl si exposés	-	-

Obl = obligatoire **Rec** = recommandé

Vaccination du personnel soignant

Couverture vaccinale

- Bonne pour les vaccins obligatoires
- Moins bonne pour les vaccins recommandés

Personnel de plus en plus jeune

- Bien vacciné dans l'enfance
- Exigences vaccinales au début des études
- Exigences vaccinales à l'embauche
- Et après.....

Vaccination et immunodépression

Les patients aspléniques

Les patients vivants avec le VIH

Quels vaccins pour le patient immunodéprimé?

Vaccins autorisés	Vaccins contre indiqués
vaccins inactivés, tués anatoxines fragments cellulaires	Vaccins vivants atténués : WA
dTPca, grippe , Hépatites A- B Méningo. A,C,W135,Y pneumocoque, typhoïde, rage, HPV, zona sous unitaire	Rougeole - oreillons - rubéole : varicelle, zona, BCG grippe nasal, fièvre jaune Vaccins possibles (BCG exclu) si ID contrôlée

Vacciner le splénectomisé

Incidence des infections graves :

- Il à 10% soit 50 à 100 fois plus que la PG
- Streptococcus pneumoniae (50 à 90% des cas), Haemophilus influenzae de type b (10 à 15%), Neisseria meningitidis.. Grippe (surinfection)

Overwhelming postsplenectomy infection : OPSI

- Sepsis fulminant invasif: décrit surtout avant la vaccination anti-pneumococcique et anti haemophilus
 - 50-70% des OPSI au cours des 2-3 premières années

Legrand et al. Ann Fr Anesth Reanim 2005;24(7):807-13

Antonio Di Sabatino. Rita Carsetti. Gino Roberto Corazza Post-splenectomy and hypo-splenic states Lancet 2011; 378: 86-97

Paediatr Child Health 1999 Sep; 4(6): 427-431

HSCP Vaccination des patients aspléniques ou hypospléniques P118

Les aspléniques sont exposés

Aux bactéries encapsulés

■ Rate : un vrai filtre absent

Risque faible	Traumatique
Risque Intermediaire	Sphérocytose , PTI, Hypertension portale
Risque élevé	Drépanocytose Thalassémie, Hodgkin, Leucémie....

Age/an	Infection
0-16	16.5%
17-29	12.9%
30-49	20.7%
50-59	23.1%
60-69	24.0%
70+	22.7%

Lutwick LL Life threatening infections in the asplenic or hyposplénie individual. Curr Clin Top Infect Dis. 2002;22:78-96, .

Kyaw MH et al. Evaluation of severe infection and survival after splenectomy. Am J Med. 2006 Mar;119(3):276 el-7

Quand Vacciner ?

Dès le diagnostic = prévention primaire

- Asplénie fonctionnelle : dès que possible

Splénectomie programmée,

- Statut vaccinal du patient / germes encapsulés;
- Vacciner au moins 2 semaines avant l'intervention

Splénectomie en urgence:

- 2 études : Bonne réponse immunitaire si vaccins administrés dans un délai minimal de 2 sem. après l'intervention .
- Si patient à risque d'être perdu de vue, il est préférable de le vacciner sans délai avant la sortie de l'hôpital.

Vaccinations de l'adulte asplénique

dTPca :	Rappel si besoin
RO R	Rattrapage si non ID et si né après 1980
Varicelle	Si Sérologie négative
Vac Méningocoque Conjugué A+C+Y+W135 meningocoque B	2 doses à 6 mois d'intervalle 2 doses à >+ un mois d'intervalle
Pneumocoque. PVC13 pneumocoque PnV23	Une dose Une dose 2 mois après le PVC13
Haemophilus (Hib)	Une dose
Hépatite B	3 doses JO- MI- M6
Hépatite A	2 Doses JO et M12
Grippe saisonnière	Annuelle

Les vaccins vivants ne sont pas CI sauf si ID associée

L'antibioprophylaxie

r Antibioprophylaxie		
	Intraveineuse	Amoxicilline (500 mg x 2/j) ¹
	Voie orale	Pénicilline V (1M d'Unité x 2/j)
	Allergie	Érythromycine (500 mg/j)
	Durée	Minimum 2 ans & prolonger si signes d'hyposplénisme ou facteurs de risque de pneumococcie invasive *

Durée controversée variable de 2 ans à toute la Vie

- Chez l'enfant,
jusqu'au moins l'âge de 5 ans .
- Chez l'adulte,
Risque de sepsis élevé les 2
années post-splénectomie
 - **Recommandée pendant une
durée d'au moins 2 ans**

Vacciner le patient VIH +

- Réponse vaccinale plus faible que chez l'immuno-compétent
- le traitement universel précoce du VIH restaure un bon statut immunologique

Le contrôle virologique et un bon statut immunologique permettent une bonne réponse vaccinale

Pas de contre-indication aux VVA
si $CD4 > 200$

Recommandations vaccinales PVVIH

Vaccins recommandés	Vaccins non recommandés:
dTPca Grippe annuel Hépatite B*, Hépatite A Pneumocoque HPV/âge	BCG = CI ROR indication chez l'enfant Varicelle à discuter Si voyage : F. Jaune si CD4 > 200 ...

*schéma renforcé 4 doubles doses

Vacciner jeune et ou avant toute
pathologie chronique, ID et traitement IS

Vacciner les soignants pour
protéger les soignés

Vacciner l'entourage pour
protéger les patients fragiles

Vacciner pour le bien de tous,
protection individuelle et collective

Vacciner pour éradiquer et contrôler les maladies infectieuses graves

Variole : 1979

Polio : 2016

...presque