DU ACAI 2023

Infections Intra-Abdominales

Dr Perrine BORTOLOTTI

Réanimation Polyvalente et Unité de Surveillance Continue
Equipe mobile d'infectiologie
CH ROUBAIX

Quelques définitions

Infections intra-abdominales

Infection d'un **organe** et/ou d'un **espace** de la cavité abdominale

Non compliquées

Infection au dépens d'un seul organe
SANS rupture anatomique

Traitement chirurgical pas toujours requis

Compliquées

Infections étendues au delà de l'organe avec **contamination microbienne de l'espace intra-péritonéal**, normalement stérile

Prise en charge initiale le plus souvent chirurgicale pour le contrôle de la source

Infections intra-abdominales

Infection d'un **organe** et/ou d'un **espace** de la cavité abdominale

Non compliquées

Infection au dépens d'un seul organe **SANS rupture anatomique**

Traitement chirurgical pas toujours requis

Appendicite
Cholécystite
Angiocholite
Diverticulite...

NON COMPLIQUEES
= pas de perforation ni nécrose

Infections intra-abdominales

Infection d'un **organe** et/ou d'un **espace** de la cavité abdominale

Complicquées

Infections étendues au delà d'un organe, avec **contamination microbienne de l'espace intra-péritonéal**, normalement stérile

Prise en charge initiale le plus souvent chirurgicale pour le contrôle de la source

PERITONITES

Péritonite

Inflammation aiguë de la séreuse péritonéale due à la présence dans la cavité péritonéale d'un liquide septique

Primitive

Infection de liquide d'ascite

Infection de liquide de dialyse péritonéale

Tuberculose péritonéale

Secondaire

Par perforation ou nécrose d'organe IA

Post opératoire:
Lâchage d'anastomose,
de suture, de moignon

Post traumatique:
Fermé ou pénétrant

Tertiaire

Evolution défavorable
d'une péritonite
secondaire
(persistance ou
complication)

Associé aux soins:

Péritonites post-opératoires survenant après une chirurgie initiale réglée ou en urgence, propre ou septique

Péritonites nosocomiales

Un peu d'anatomie

Anatomie des mésos

Etages sus mésocolique / sous mésocolique

→ différence d'écologie bactérienne

Etage sus –mésocolique

Œsophage abdominal
Duodenum (pancreas)
Foie Rate
Voies biliaires Vésicule

Etage sous –mésocolique

Grêle = jejunum et iléon
Colon
Rectum

Cavité péritonéale

- Petite cavité péritonéale
= arrière cavité des épiploons
- Grande cavité péritonéale

Grande cavité péritonéale, en gris
Petite cavité péritonéale, en rose
Rétro-péritoine, en vert

Bourse omentale :
1-Foramen épiploïque (porte bleue)
2-Vestibule
3-Foramen bursæ omentalis (p. rouge)
4-Poche rétro-gastrique
5-Epiploon pancréatico-splénique
6-Epiploon gastro-splénique
7-Petit omentum (E. gastro-hépatique)

Mouvements liquidiens intrapéritonéaux

Le liquide péritonéal guidé par les replis méésentériques (1 et 2) et des mésos (mésosigmoïde) (3 et 4) se collecte dans les fosses iliaques (5). Le liquide remonte vers le diaphragme par la gouttière pariétocolique droite (6). Il arrive dans l'arrière-cavité des épiploons (zone en pointillés) (9) par la fosse hépatorénale de Morrison et le hiatus de Winslow (7). Le liquide irrigue également la région périhépatique à partir de l'espace sous-phrénique postérieur (8). La zone préférentielle de résorption du liquide péritonéal se situe sur la face inférieure du diaphragme (cercle bleu clair)

Localisations préférentielles des abcès intra-abdominaux:
sous phrénique D>G et dans les FI/gouttières

Un peu de microbiologie

Ecologie bactérienne selon l'anatomie

10^2 bact/g
matières

10^{14} bact/g matières
anaérobies=1000aérobies

Inoculum ↗ par pullulation:

- Antiacides
- Sang / Bile
- Occlusion

Biliaire

- *E. coli*
- Streptocoques/ enterocoques
- Anaérobies

Sus-mésocolique

- **Entérobactéries** (*E. coli*)
- **CGP** Streptocoques, staph, entérocoques
- *Candida*

Sous-mésocolique

- **Anaérobies** (*Bactéroïdes*, *Clostri*)
- **Entérobactéries** (*E. coli*)
- **CGP**: Streptocoques, entérocoques

Ecologie bactérienne péritonites communautaires vs associées aux soins

Péritonites

Péritonite primitive

Inflammation aiguë de la séreuse péritonéale

Due à la présence dans la cavité péritonéale d'un liquide septique

Primitive

Infection de liquide d'ascite

Infection de liquide de dialyse péritonéale

Tuberculose péritonéale

Secondaire

Par perforation ou nécrose d'organe IA

Post opératoire:
Lâchage d'anastomose,
de suture, de moignon

Post traumatique:
Fermé ou pénétrant

Tertiaire

Evolution défavorable
d'une péritonite
secondaire

Péritonite primitive

Inflammation aiguë de la séreuse péritonéale

Due à la présence dans la cavité péritonéale d'un liquide septique

Primitive

Infection de liquide d'ascite

Infection de liquide de dialyse péritonéale

Tuberculose péritonéale

Secondaire

Par perforation ou
nécrose d'organe
=> RARES

Post opératoire:
Lâchage d'anastomose,
de suture, de moignon

Post traumatique:
Fermé ou pénétrant

Tertiaire

Evolution défavorable
d'une péritonite
secondaire

Péritonite

Inflammation aiguë de la séreuse péritonéale

Due à la présence dans la cavité péritonéale d'un liquide septique

Primitive

Infection de liquide
d'ascite

Infection de liquide de
dialyse péritonéale

Tuberculose péritonéale

Secondaire

Par perforation ou
nécrose d'organe IA

Post opératoire:
Lâchage d'anastomose,
de suture, de moignon

Post traumatique:
Fermé ou pénétrant

Tertiaire

Peut être défavorable
communautaire ou
nosocomiale

Etiologies des péritonites secondaires

Fig 1 | Common etiologies of secondary peritonitis in adults

Péritonite

Primitive

Infection de liquide d'ascite

Infection de liquide de dialyse péritonéale

Tuberculose péritonéale

Secondaire

Par perforation ou nécrose d'organe IA

Post opératoire:
Lâchage d'anastomose,
de suture, de moignon

Post traumatique:
Fermé ou pénétrant

Tertiaire

Evolution défavorable
d'une péritonite
secondaire

**-> Forcément
nosocomiale ET
postopératoire**

Traitement des infections intra-abdominales

Prise en charge des infections intra-abdos

Facteurs pronostiques:

- Délai du diagnostic
- Délai de prise en charge thérapeutique
- Adaptation du geste chirurgical et contrôle adéquat de la source
- Adaptation des traitements anti-infectieux

Prise en charge des infections intra-abdos

- Quelle que soit la technique
 - laparotomie
 - laparoscopie
 - drainage

l'éradication du foyer infectieux doit être systématique et en urgence
- L'initiation des anti-infectieux ne doit pas être différée pour effectuer les prélèvements microbiologiques péritonéaux
- Les échecs de traitement sont souvent des échecs de contrôle de la source, rarement d'antibiothérapie

Geste chirurgical

COELIOSCOPIE si possible sauf:

- péritonite généralisée
- péritonite stercorale

LAPARATOMIE

Délai de la chirurgie et pronostic

Etude observationnelle prospective multicentrique au Danemark
2803 laparotomies ou coelioscopies en urgence dans les 48h après admission

Dans les 24 premières heures, chaque heure associée à une diminution médiane de 2,2% de la survie à J90 (péritonites généralisées)

Chirurgie adéquate et pronostic

Prélèvements à effectuer

- Analyse du liquide péritonéal:
 - Examen direct
 - Culture
- Si choc septique ou infection nosocomiale:
 - Hémocultures
 - ED à la recherche de levures

But:

- identification microbienne et fongique
- détermination de la sensibilité aux anti-infectieux

Antibiothérapies des infections intra-abdominales

Antibiothérapies des infections intra-abdominales

De quoi parle-t-on?

- Communautaire vs associée aux soins
- Non sévère vs sévère
- Antibiothérapie probabiliste vs documentée

Histoire naturelle des péritonites

Rationnel de l'antibiothérapie des IIA

Genta: anti-BGN

Clinda: anti-anaérobie

Antibiothérapie

ATB probabiliste: ciblant les pathogènes les plus fréquents

- Très fréquents

- *E. coli*
- *Bacteroides*

- Fréquents

- Autres entérobactéries
- *Streptocoques*
- *Clostridium*

- Associés aux soins

- *P. aeruginosa*
- Entérocoques
- Levures

ATBthérapie
probabiliste IIA
communautaire

ATBthérapie
probabiliste IIA
nosocomiale ou
sévère

Quelle antibiothérapie probabiliste?

Communautaire

Non grave

(1) amoxicilline/acide clavulanique + genta

(2) céfotaxime ou ceftriaxone + métronidazole

Grave:

Pipéracilline/tazobactam +/- genta

Risque d'allergie pénicilline

Céfépime + métronidazole +/- genta

+/- échinocandine

Nosocomiale/ associée aux soins

Non grave

Sans FDR de BMR

pipéracilline/tazobactam +/- amikacine

FDR de BMR

Carbapénème

Avec signes de gravité:

+ amikacine

+ échinocandine

Dans tous les cas: couvrir les bactéries anaérobies

Entérocoques et levures

Rôle discuté de l'entérocoque:

- classiquement, pathogénicité imputable “faible”
- “trou” dans le spectre de nombreux ATB probabilistes
- incidence élevée dans les IAA associées aux soins
- associé à une augmentation de la morbi-mortalité

Rôle discuté des levures (*C. albicans*)

- Idem entérocoque concernant la pathogénicité
- également associé à une augmentation de la morbi-mortalité
- à considérer en fonction des FdR, de l'étiologie de la péritonite et de la gravité

L'impasse est interdite en cas d'infection sévère

Dans une péritonite non grave, c'est la chirurgie qui guérit!

Couverture des entérocoques

Communautaire

Sans signe de gravité: NON
même si présent dans le liquide de culture

SAUF

- bactériémie associée
- seule bactérie identifiée
- immunodéprimé

Avec signes de gravité: OUI

E. faecalis

En probabiliste ET en documenté

Nosocomiale/ associée aux soins

OUI en probabiliste et documenté
E. faecalis

Si facteurs de risque d'IIA à entérocoque résistant à l'ampicilline

(*E. faecium*):

- pathologie hépatobiliaire,
- transplanté hépatique,
- antibiothérapie en cours,

Discuter couverture dans l'antibiothérapie probabiliste

Molécules actives:

E. faecalis: amoxicilline ou pipéracilline

E. faecium: vancomycine, linézolide, tigécycline

Couverture des levures (*Candida*)

Communautaire

Sans signe de gravité: NON
même si présent dans le liquide
péritoneal (ED ou cult)

**Avec signes de gravité:
OUI si**

- *au moins 3 des critères suivants:
 - défaillance hémodynamique,
 - sexe féminin,
 - chirurgie sus- mésocolique,
 - antibiothérapie depuis plus de 48h
(Score de Dupont)
- *si levures + ED et/ou culture

Nosocomiale/ associée aux soins

Sans signe de gravité:
selon ED et culture du liquide
péritoneal

- ED+: initier un traitement ATF
probabiliste
- Culture+: initier un traitement ATF
curatif

Avec signes de gravité:
Plutôt oui si choc, même si ED négatif,
arrêt si culture négative

Molécules de choix:

échinocandines si infection grave ou souche fluconazole-R (*C. glabrata*)

Fluconazole sinon.

Risque de BMR et colonisation antérieure

Péritonite communautaire sans signe de gravité:

Pas de prise en compte du risque de BMR (sauf écologie ou zone géographique particulières) dans le ttt probabiliste

Péritonite associée aux soins / immunodéprimé:

Evoquer un **risque élevé de BMR si:**

- antibiothérapie dans les 3 mois précédents
- durée d'hospitalisation ou délai de ré-intervention > 5 jours

Tenir compte en probabiliste des bactéries colonisantes si patients porteurs connus <3 mois de :

- entérobactéries résistantes aux C3G
- entérocoques ampicilline et/ou vancomycine-R
- SARM

Aminosides

Indications:

- sepsis/ choc septique,
- neutropénique
- FDR de BMR

Péritonite communautaire

Signes de gravité: au moins **deux des éléments suivants**:

- Hypotension rapportée au sepsis
- Lactates plasmatiques au-dessus des valeurs normales du laboratoire
- Diurèse < 0,5 mL/kg/h pendant plus de 2 heures malgré un remplissage adapté
- Ratio PaO₂/FiO₂ < 250 mmHg en l'absence de pneumopathie
- Créatininémie > 2 mg/dL (176,8 µmol/L)
- Bilirubinémie > 2 mg/dL (34,2 µmol/L)
- Thrombopénie < 100 000 /mm³

Entérobactéries, strepto, anaérobies
+ enterocoque, pyo

Entérobactéries, strepto, anaérobies

Au moins 3 des critères :
défaillance hémodynamique,
sexe féminin,
chirurgie sus-mésocolique,
antibiothérapie depuis plus de 48 heures

Péritonite associée aux soins

Antibiothérapie documentée?

Quel que soit le résultat des prélèvements :

- **couvrir les bactéries anaérobies**
en probabiliste comme en documenté
- **désescalade** antibiotique et antifongique
dès stabilisation clinique et contrôle de la source

Durée des antibiothérapies **post-opératoires**

Pas d'atb
postop ou <24h

- Perforation intestinale traumatique opérée dans les 12h
- Perforation gastroduodenale opérée dans les 24h
- Appendicite aiguë non compliquée opérée
- Cholecystite aiguë non compliquée opérée

2-3j

Péritonite
Communautaire

**localisée
opérée ou drainée**

Angiocholite drainée

4j

Péritonite
Communautaire

**généralisée
opérée ou drainée**

Etude
STOP-IT
(4 vs 8j)

5-7j

Péritonite
post-opératoire

secondaire et tertiaire

**opérée ou drainée
efficacement**

Etude
DURAPOP
(8 vs 15j)

CAT en cas d'évolution défavorable

Traitement antibiotique 5 à 7 jours max

Si contrôle incomplet de l'infection à J5:

- anomalies cliniques,
- persistance du syndrome inflammatoire biologique
- anomalie des fonctions intestinales, défaillance respiratoire

TDM AP injecté +/- reprise chirurgicale

ou ponction / drainage radioguidé

Parfois prolongation des atb nécessaire:

- Si reprise au bloc avec nouveau lavage et prlv
- Si abcès
- Surtout chez les immunodéprimés

Facteurs de gravité d'une péritonite

- Inoculum (donc ~ distalité digestive, stercorale+++)
- Biliaire
- **Délai de chirurgie**
- **Qualité de la chirurgie**
- Patient : âge, terrain, immuno- etc...
- Sepsis, sepsis sévère, choc septique, SDMV
- **Anaérobies, entérocoques, levures**
- **Polymicrobien**

Conclusion IIA

- Situation clinique fréquente
- Cavité intra-abdominale: physiologie propre
- Succès thérapeutique = contrôle de la source
- Déterminer « le cadre précis » pour le choix de l'ATB probabiliste:
 - péritonite primitive, secondaire, tertiaire
 - communautaire vs associée aux soins
 - Signes de gravité
 - Terrain
- Couvrir systématiquement les anaérobies pour toute la durée du tt
- Respect des durées d'antibiothérapie
- Réévaluation TDM et reprise chirurgicale ou drainage en cas d'évolution défavorable

Principaux guidelines

- **2022:** Li et al. SPD peritonitis guideline recommendations: 2022 update on prevention and treatment, *Peritoneal Dialysis International*
- **2021:** appendicite de l'adulte : recommandations pour la pratique clinique de la Société française de chirurgie digestive (SFCD) et de la Société d'imagerie abdominale et digestive (SIAD) Volume 158, Issue 3, June 2021, Pages 263-273
- **2018:** Infectious Diseases Society of America (IDSA) and the American Society for Microbiology (ASM): A guide to utilization of the microbiology laboratory for diagnosis of infectious diseases, update 2017: Mazuski JE, et al. The Surgical Infection Society revised guidelines on the management of intra-abdominal infection. *Surgical Infections* 2017; 18: 1-76.
- **2017:** World Society of Emergency Surgery (WSES): The management of intra-abdominal infections from a global perspective – Guidelines for management of intraabdominal infections Choosing Wisely UK: British Society for Antimicrobial Chemotherapy – Consider stopping antibiotics after 4 days for patients with abdominal infection under control after operation or drain (2016)
- **2017:** Prise en charge médicale et chirurgicale de la diverticulite colique, has
- **2018:** Prise en charge des infections intra-abdominales *Anesth Reanim.* 2018; 1: 75–99
- **2015:** Stollman N, et al. American Gastroenterological Association Institute guideline on the management of acute diverticulitis ; 149: 1944- 1949.