

Traitement local ou traitement oral ou les 2 ?

Aucune étude concluante mais,

✓ **Traitement local seul si :**

- ✓ Enfant < 15 kg
- ✓ Femme enceinte à nuancer car recul rassurant
- ✓ Intolérance au traitement oral

✓ **Traitement oral ou local si :**

- ✓ Gale commune

✓ **Traitements oral + local si :**

- ✓ Gale profuse, extensive de l'ID ...

Les scabicides agissent sur le SNC de l'ectoparasite

Les scabicides locaux sont en plus ovicides mais à des degrés divers,

donc quelque soit le traitement:

2 cures à J0 et à J7-10 jours, sauf cas particuliers dont les sujets contacts... (1 seule cure suffit)

Les scabicides locaux :

Type de scabicide	Caractéristiques
Permethrine à 5% : Topiscab [®] . Lipophilie à appliquer sur peau séchée (non réhydratée) Recos: 2^{ème} cure 7-10 jours après	Tube de crème à 30 gr suffit pour 2 cures à partir de 12 ans 6 à 12 ans : 15 gr soit la ½ du tube 2 à 5 ans : 7,5 gr (taille de 2 noisettes) 2 mois à 2 ans : 3,75 gr (taille d'1 noisette) Laisser sécher la peau 5-10 mn sans habits Durée de contact: au moins 8H puis se laver
Benzoate de benzyle (BB): Ascabiol [®] Recos: 2^{ème} cure 7-10 jours après	Emulsion à 10 % si enfant, 25% si adulte. Parfois associé au soufre 5-10% Prendre un bain ou une douche avant les applications (utiliser une compresse) 2 applications à 15 min d'intervalle si adulte et 1 seule application si enfant ou femme enceinte Durée de contact: 24 H si adulte, 6 -12 H si enfant puis se laver
Crotamiton: Eurax [®]	Crème pour applications 3 à 5 jours de suite ! (n'est plus commercialisé)

Le traitement scabicide oral :

Un seul commercialisé pour le moment	Cp à 3mg Sirop pour les enfants pour bientôt
<p>Ivermectine, Stromectol[®] : 200 µg /kg à partir de 15 kg Si grossesse, recul rassurant mais ... A prendre le matin à jeun et attendre 2 H pour manger, à nuancer car un repas améliorerait l'absorption selon les études Recos: 2^{ème} cure 7-10 jours après</p>	<p>> = 80 kg : 6 cps 66-79 kg : 5 cps 51-65 kg : 4 cps 36-50 kg : 3 cps 25-35 kg : 2 cps 15-24 kg : 1cp</p>
<p>Moxidectine peut être pour bientôt ! en une seule cure (traite l'acné rosacée ...)</p>	<p>½ vie longue pratique pour couvrir le cycle du parasite</p>

Traitement de l'environnement des cas de gale

Traitement concomitant et dès le lendemain du tt local ou oral

Linge de corps, draps... utilisés depuis moins de 72H

- changer et Laver à $> 60^{\circ}\text{C}$ durant 30 mn tous les les 3 jours sur 10 jours; donc 3 fois

1- La literie

- désinfecter le lit et ne pas utiliser durant 12 à 24 heures puis aspirer (l'aspiration peut suffire parfois)

2- Objets non lavables ou trop fragiles

- Imprégner de scabicides durant 3 H dans un sac,
- ou quarantaine dans un sac à un endroit sec et $> 20^{\circ}\text{C}$ durant 3 jours voire 8 jours si gale profuse
- ou congélation 5 H à -25°C