

BON USAGE DES ANTISEPTIQUES

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | POVIDONE IODÉE BÉTADINE SCRUB® | Détersion peau Lavage plaies | Diluer au tiers Rincer à l'eau du réseau | 1 mois - Noter la date d'ouverture sur flacon |
|  | POVIDONE IODÉE BÉTADINE DERMIQUE® | Antiseptie plaies Champ opératoire (certaines spécialités) | Pur Après détersion à Bétadine scrub® Respecter temps de contact (1 mn) | 1 mois - Noter la date d'ouverture sur flacon |
|  | POVIDONE IODÉE BÉTADINE ALCOOLIQUE® | Désinfection peau Champ opératoire | Pur Après détersion à Bétadine scrub® Respecter temps de contact (1 mn) | 1 mois - Noter la date d'ouverture sur flacon |
|  | POVIDONE IODÉE BÉTADINE VAGINALE® | Voie vaginale | Badigeonnage | 1 mois - Noter la date d'ouverture sur flacon |
|  | ALCOOL MODIFIÉ | Désinfection • flacons médicamenteux • peau • embouts et robinets de voies veineuses | Pur Respecter temps de contact (1 mn) | 1 mois - Noter la date d'ouverture sur flacon |
|  | DAKIN® | Antiseptie peau, muqueuses et plaies AEV | Pur Après détersion au savon Respecter temps de contact (1 mn) | 1 mois - Noter la date d'ouverture sur flacon |
|  | CHLORHEXIDINE AQUEUSE HIBISCRUB® | Si intolérance à la gamme Bétadine Détersion peau Lavage plaie | Diluer et rincer à l'eau du réseau - Ne pas utiliser sur l'oeil, conduit auditif et sous pansement occlusif - Respecter la gamme de produits Ne pas associer au Dakin® | 1 mois - Noter la date d'ouverture sur flacon |
|  | CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE 0,5%® | Si intolérance à la gamme Bétadine Désinfection peau Champ opératoire | Pur - Après détersion à Hibiscrub® - Ne pas utiliser sur l'oeil, conduit auditif et sous pansement occlusif - Respecter la gamme de produits et temps de contact (3 à 4 mn) Ne pas associer au Dakin® | Avec colorant : 8 jours Sans colorant : 1 mois Noter la date d'ouverture sur flacon |
|  | BACTISEPTIC® CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE 2% | Désinfection de la peau avant pose d'un dispositif invasif | Pur Attendre le séchage complet | 1 mois - Noter la date d'ouverture sur flacon |
|  | BISEPTINE® | Antiseptie de la peau chez l'enfant | Pur Attendre le séchage complet | 1 mois - Noter la date d'ouverture sur flacon |