	MODE OPERATOIRE	MO INF 019 V1	
	REALISER LE CHANGE AU LIT D'UN PATIENT OU D'UN RÉSIDENT DÉPENDANT	Date d'application : 28/06/2018	Page 1/3

Rédaction <i>(nom et fonction)</i>	Visa	Vérification <i>(nom et fonction)</i>	Visa	Approbation support <i>(nom et fonction)</i>	Visa
V. LEFEBVRE – IDE – UHLIN		Dr P. PATOZ – Président du CLIN		R. RUTHMANN – Directeur qualité gestion des risques	
M. DUHAMEL – CS – UHLIN		Dr S. ALFANDARI – PH – UHLIN			
N. DUQUESNOY - AS – Médecine interne		F. REY – Directrice des soins			

OBJET

Réaliser le change au lit d'un patient (ou d'un résident) dépendant en respectant les précautions standard et en limitant le risque de transmission des entérobactéries

DOMAINE D'APPLICATION (secteurs concernés)

Tous services de soins

PERSONNEL CONCERNÉ

IDE, AS

RÉFÉRENCES

Références législatives, réglementaires et normatives

Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, activité 2 : Soins de confort et de bien être

Code de la Santé Publique, article R4311-4

Surveiller et prévenir les infections associées aux soins, R39, HCSP-SFHH, septembre 2010

Change au lit d'un patient dépendant dans les établissements de santé et médicosociaux, ARLIN Nord – Pas de Calais, février 2017

Actualisation des Précautions standard, Établissements de santé, Établissements médicosociaux, Soins de ville, R15 et R28, SF₂H, Juin 2017

Références internes

Enregistrement « Hygiène des mains : lavage ou friction » (EN INF 006)

Procédure « Eliminer les déchets d'activité de soins » (PG INF 020)

Procédure « Mettre en place les précautions standard » (PG INF 010)

LISTE DES ANNEXES

NA


MOTS CLÉS


Change

DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

DAOM : Déchet Assimilable aux Ordures Ménagères

HCSP : Haut Conseil de la Santé Publique

QUI	fait	et COMMENT
<p style="text-align: center;">AS</p>	 <pre> graph TD Start([Changer le patient]) --> Step1[1 Préparer le matériel] Step1 --> Step2[Mettre le tablier plastique] Step2 --> Step3[Pratiquer l'hygiène des mains] Step3 --> Step4[Porter des gants non stériles] Step4 --> Step5[Eliminer la protection souillée] Step5 --> Step6[2 Effectuer une toilette génito-anale] Step6 --> Step7[Eliminer les gants à usage unique] Step7 --> Step8[Pratiquer l'hygiène des mains] Step8 --> Step9[Effectuer un effleurage si nécessaire] Step9 --> Step10[Faire la réfection du lit si nécessaire] Step10 --> Step11[Réinstaller le patient] Step11 --> Step12[Vider et nettoyer la bassine] Step12 --> Step13[Eliminer le tablier plastique] Step13 --> Step14[Pratiquer l'hygiène des mains] Step14 --> End([Le patient est installé]) </pre>	<p>Cf. « Mettre en place les précautions standard » (PG INF 010)</p> <p>Cf. "Hygiène des mains" (EN INF 006)</p> <p>Emballage primaire : petit sac DAOM</p> <p>Cf. "Eliminer les déchets d'activité de soins" (PG INF 020)</p> <p>Cf. "Hygiène des mains" (EN INF 006)</p> <p>Emballage primaire : petit sac DAOM</p> <p>Cf. "Hygiène des mains" (EN INF 006)</p>

	MODE OPERATOIRE	MO INF 019 V1	
	REALISER LE CHANGE AU LIT D'UN PATIENT OU D'UN RÉSIDENT DÉPENDANT	Date d'application : 28/06/2018	Page 3/3

PRÉ-REQUIS

Les excréta (selles, urines...) peuvent être une source importante de dissémination des entérobactéries, mais aussi d'autres bactéries à transmission oro-fécale (ex: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Clostridium difficile, entérocoques...).

Le change est un soin réalisé plusieurs fois par jour, nécessitant une organisation rigoureuse pour éviter la transmission croisée.

Le matériel nécessaire au change est déposé sur un plan de travail propre.

1- PREPARER LE MATÉRIEL

- Nacelle
- Chariot de linge
- Tablier plastique
- Gants
- Alèse
- Protection
- Nécessaire de toilette
- Sac déchets DAOM ?
- Serviette
- SHA
- Savon et nécessaire d'effleurage
- Détergent-désinfectant

2- EFFECTUER UNE TOILETTE GÉNITO-ANALE

- Procéder à la toilette (utiliser une bassine et du linge de toilette propre)
- Installer le patient sur le côté
- Replier l'alèse souillée au plus près du patient
- Entretenir le matelas si nécessaire
- Poser l'alèse propre
- Tourner le patient de l'autre côté
- Dégager l'alèse
- Terminer la réfection du lit
- Eliminer le linge souillé dans la nacelle en respectant le tri.