

## PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES

### - EN HOSPITALISATION OU SOINS A DOMICILE -

Signalez le portage de BMR aux soignants qui visitent votre enfant (infirmier, médecin, kinésithérapeute, aide-soignant, ...) afin qu'ils respectent des précautions, essentiellement l'hygiène des mains.




### - SOINS DE SUITE -

Les mesures d'hygiène de base doivent absolument être respectées :

hygiène des mains,  
hygiène corporelle,

changement de vêtement...

Dans certains cas, il pourra être demandé à votre enfant de rester dans sa chambre.




Si votre enfant doit être à nouveau hospitalisé dans les mois qui suivent, signalez qu'il a été porteur de BMR afin qu'une recherche soit faite, si possible, à son admission.

Si ces informations soulèvent des questions, le personnel soignant et les professionnels de l'hygiène de l'établissement sont prêts à y répondre.

N'hésitez pas à vous adresser à eux :

## PAS DE PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

### - AU DOMICILE -



Avec le temps, ses bactéries habituelles vont remplacer le plus souvent celles acquises à l'hôpital. Votre enfant peut

donc reprendre ses activités scolaires et extrascolaires, sans précautions particulières en respectant simplement une hygiène corporelle quotidienne.



### - VIE EN COLLECTIVITE -



Crèche, centre de vacances, ...  
Aucune précaution particulière n'est nécessaire.

Les mesures d'hygiène de base doivent absolument être respectées :  
hygiène des mains,  
hygiène corporelle,  
changement de vêtement.

Coordonnées de l'hôpital :

**Votre enfant est porteur  
d'une bactérie multi-résistante  
aux antibiotiques (BMR)**



**Voici quelques informations et  
précautions simples d'hygiène à respecter  
pour éviter la transmission de cette bactérie**

Actualisation septembre 2014  
(Version 1 - 2005)



Coordonné par le CCLin Paris-Nord.  
Rédaction V2 :  
M. Aggoune, N. Baghdadi, A. Brenet,  
D. Landriu, I. Novakova,  
Y. Ollivier, D. Thillard




<http://www.cclinparisnord.org>  
<http://www.cclin-arlin.fr>

## QU'EST-CE QU'UNE BMR ?

Nous sommes tous porteurs de bactéries : sur notre peau, nos muqueuses et dans notre tube digestif. La plupart de ces bactéries sont naturellement sensibles aux antibiotiques mais elles peuvent devenir résistantes parfois sous l'influence de traitements antibiotiques. Il est alors difficile de soigner les infections causées par ces bactéries.

Exemple : *staphylocoque doré multi-résistant*,  
*Klebsiella pneumoniae productrice de BLSE*

## QUELS SONT LES MODES DE TRANSMISSION ?



## COMMENT SAIT-ON QU'UN ENFANT EST PORTEUR DE BMR ?

Tout enfant hospitalisé peut être porteur.

Le portage est identifié :

- soit lors d'un dépistage au niveau du nez, de la peau, sur les plaies, ou dans le rectum.
- soit lors d'une infection.

Certaines précautions peuvent prévenir la transmission des BMR.

## PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES

### - EN HOSPITALISATION DE COURTE OU MOYENNE DUREE -

Un logo apposé sur la porte de sa chambre et ses dossiers permet de signaler à tous, soignants et parents, les précautions qu'ils doivent prendre lors des soins et des visites.



### Mesure essentielle pour l'enfant, les parents et les visiteurs

Hygiène des mains  
avec un produit hydro-alcoolique\*  
avant de sortir de la chambre



\* attention au risque d'ingestion chez le petit enfant : accompagnement nécessaire

### Autres mesures

#### POUR L'ENFANT

- Procéder à une toilette et au changement de vêtements quotidiennement
- N'utiliser que les W.C. de la chambre, puis faire une hygiène des mains
- Interdire les déplacements dans les autres chambres
- Préférer si possible les jeux dans la chambre aux jeux collectifs

#### POUR LES PARENTS ET LES VISITEURS

- Ne pas être plus de 2 visiteurs dans la chambre si possible

Selon la situation, d'autres précautions peuvent vous être demandées (ex : surblouse)

### Pendant combien de temps ces précautions doivent-elles être prises ?

Généralement, pendant toute la durée de l'hospitalisation si elle est courte. Si l'hospitalisation se prolonge, une réévaluation sera faite par le médecin.